

# Avertissements<sup>®</sup>

## agricoles Lorraine

Bulletin n° 24 du 26 septembre 1989

Numérotation continue : n° 103

### Grandes cultures

#### COLZA :

- Grosses altises : vol faible mais généralisé.
- Présence de mildiou.
- Attention aux limaces !

#### CEREALES :

- Pucerons : mise en garde.

#### COLZA :

##### - Grosses altises :

##### Situation :

Le vol a démarré dans toutes les régions et des dégâts sont visibles sur cotylédons et feuilles.

##### Préconisations :

Rechercher les morsures sur feuilles dans vos parcelles.

Un traitement est recommandé si :

- . Au stade B2, 3 pieds sur 10 présentent des morsures.
- . Après le stade B2, 20 à 30 captures cumulées sont observées dans la cuvette jaune.

##### - Mildiou :

Le temps frais la nuit et la rosée du matin favorisent le développement du mildiou. Un feutrage blanc est visible à la face inférieure des cotylédons et des premières feuilles, entraînant un jaunissement à la face supérieure.

Ces dégâts survenant au stade B2 sont sans incidence sur le développement du colza et ne nécessitent en aucun cas un traitement.

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP N° : 2011 AD

Abonnement annuel :

190 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38, rue Sainte-Catherine

54043 NANCY CEDEX

Tél. 83 30 41 51



P 178

### - Limaces :

Des dégâts sont signalés suite aux périodes pluvieuses récentes. Les piégeages, dans notre réseau, ont été parfois importants (17 limaces / m<sup>2</sup>).



RESEAU DE PIEGEAGE LIMACES - AUTOMNE 89

1 - ANCERVILLE (55)	8 - DEMANGE-AUX-EAUX (55)	15 - BECHAMP (54)
2 - BRILLON-EN-B. (55)	9 - VILLERS-AUX-VENTS (55)	16 - LIMEY (54)
3 - MENIL-SUR-S. (55)	10 - VAVINCOURT (55)	17 - VILLE-AU-VAL (54)
4 - BRAUVILLIER (55)	11 - FRESNES-EN-W. (55)	18 - CLEMERY (54)
5 - MONTIER-SUR-S. (55)	12 - PAREID (55)	19 - LUNEVILLE (54)
6 - COUVERPUIS (55)	13 - GLISSAINVILLE (55)	20 - MERVILLER (54)
7 - HEVILLIERS (55)	14 - PREUTIN-HIGNY (54)	21 - BIONCOURT (57)

### Préconisations :

Renouveler si nécessaire les appâts empoisonnés dans les pièges. En présence de limaces, traiter avec un produit à base de métaldéhyde, mercaptodiméthur ou thiodicarbe.

### ATTENTION :

Les anti-limaces sont dangereux : Ne disposez pas le produit en tas pour éviter toute intoxication du gibier.

### CEREALES :

#### - Pucerons :

Les premiers semis d'orge sont réalisés et commencent à lever dans quelques situations très précoces.

Les semis (orge ou blé) antérieurs au 20 septembre sont généralement les plus exposés à la colonisation par les pucerons vecteurs du virus de la jaunisse nanisante.

Il faut donc surveiller leur présence.

L'observation s'effectue sur 100 plantes environ (10 fois 10 pieds) de préférence l'après-midi par temps ensoleillé.

Nous vous rappelons que l'activité des pucerons est généralement perturbée par les sécheresses prolongées et les gelées nocturnes et que depuis quatre ans aucun traitement n'a été justifié dans notre région.

Afin de limiter les foyers primaires d'infestation, il est recommandé d'éliminer les repousses (orge principalement) dans les chaumes ou les champs de colza.

Dans nos prochains bulletins figureront les résultats de nos comptages et les conditions de traitement.